


# Diverticolosi del Colon

ETIMOLOGIA LATINA

DE VERTERE = PRENDERE UNA VIA LATERALE,  
DIVERSA



# Diverticolosi del Colon

- La diverticolosi del colon può essere definita una **malattia delle società moderne**.
- La prevalenza della malattia nei soggetti sotto i 30 anni è molto bassa: 1 – 2 %
- La prevalenza della malattia aumenta in maniera significativa dopo i 50 anni per raggiungere la massima espressione dopo gli 80 anni: circa il 70 % dei soggetti


Nella stasi fecale si determinano alterazioni della flora batterica. Un transito colico rallentato è predisponente per una stasi di materiale fecale dentro il diverticolo.



## RAZIONALE

La teoria della “tasca cieca” che implica la stasi fecale e la crescita batterica è alla base della patogenesi dell’appendicite e della paucite e similmente anche dello sviluppo della infiammazione diverticolare.

La flora batterica alterata in queste regioni scatena l’infiammazione intestinale attraverso una funzione di barriera mucosa alterata attraverso il rilascio di citochine .



# RAZIONALE

I probiotici, hanno la funzione di restaurare il bilanciamento della flora enterica, attraverso la riduzione di numero dei germi patogeni gram-negativi. I probiotici incrementano la difesa mucosale attraverso l'inibizione della crescita dei germi patogeni, incrementando la resistenza della integrità delle "tight junction", impedendo di fatto la translocazione dei batteri patogeni e decrementando le citochine pro infiammatorie come il Tumor necrosis factor alpha.

# Diverticolosi del Colon

- Terapia medica
  - Dieta ricca di scorie
  - Dieta povera di scorie nel periodo di acuzie
  - Antibiotici nel periodo di acuzie
  - Antispastici ed analgesici ?
  - Prevenzione delle recidive di acuzie:
    - Antibiotici e probiotici